

naloxone

- **INDICAZIONI**
 - intossicazione da oppiacei
 - **EFFETTI COLLATERALI**
 - tachicardia
 - ipo / ipertensione
 - TV, FV
 - nausea, vomito, sudorazione
 - **CONTROINDICAZIONI**
 - non ha effetto nelle depressioni respiratorie da farmaci non oppiacei
 - **SORVEGLIANZA**
 - ritmo e frequenza cardiaca
 - pressione arteriosa
-

Dose: 0.4 mg in bolo IV, da ripetere se necessario

Naloxone

nome generico : naloxone

nome commerciale (Italia) : Narcan

preparati commerciali (Italia) : Una fiala di Narcan contiene 0,4 mg di naloxone in 1 ml di solvente.

Modalità di somministrazione: in bolo per via ev

Overdose di oppiacei: dose iniziale 0,4 – 2 mg per via ev; la dose può essere ripetuta ogni 2-3 minuti secondo la risposta clinica.

Annulare l'effetto degli oppiacei nel postoperatorio: 0,1-0,2 mg in bolo ogni 2-3 minuti fino al raggiungimento dell'effetto desiderato.

Importante:

- a) diluire con soluzione fisiologica o glucosata 5%
- b) inefficace nelle depressioni respiratorie da farmaci non-oppiacei
- c) in assenza di via venosa si può somministrare per via SC o IM