

verapamil

- **INDICAZIONI**

- angina pectoris
- aritmie sopraventricolari
- controllo frequenza ventricolare nelle TSV

- **EFFETTI COLLATERALI**

- bradicardia / BAV
- ipotensione arteriosa
- scompenso cardiaco
- cefalea

- **CONTROINDICAZIONI**

- malattia del nodo del seno
- bradicardia
- BAV (II e III grado) senza PM
- scompenso cardiaco

- **SORVEGLIANZA**

- frequenza / ritmo cardiaco
- pressione arteriosa
- funzione sistolica del ventricolo sinistro

Dose: 5-10 mg in 2 min ed altri 5 mg se necessario dopo 5 min

Verapamil

nome generico: verapamil

nome commerciale (Italia): Isoptin

preparati commerciali (Italia) : Una fiala da 2 ml di Isoptin contiene 5 mg di verapamil.

Modalità di somministrazione: in bolo, per via ev

Una fiala di Isoptin contiene 5 mg in 2 ml → 2,5 mg in 1 ml.

Iniziare con la somministrazione ev di 0,075-0,15 mg/Kg in 2 minuti. Dosi di 2,5-10 mg possono essere ripetute ogni 15-30 minuti fino al raggiungimento dell'effetto desiderato.

Dose massima consigliata 20 mg.

Se necessario proseguire con una terapia di mantenimento per via orale.

Esempio:

Se decidiamo di infondere 5 mg in bolo ev in 2 minuti → diluire una fiala in 20 ml di soluzione fisiologica ed infondere lentamente il contenuto. Se necessario, dopo 5 minuti si possono infondere (con lo stesso procedimento) delle altre dosi da 5 mg (una fiala).

Importante:

- a) diluire con: soluzione fisiologica o glucosata al 5%
- b) somministrare in bolo solo prodotto diluito
- c) infondere lentamente a causa del rischio ipotensivo
- d) prudenza nei pazienti in terapia con β -bloccanti e digitale